

Le RCP publié sur le site de l'Anses n'a pas fait l'objet d'une validation. Les informations communiquées dans ce RCP sont sous la seule responsabilité du laboratoire titulaire de l'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU).

ANNEXE

INFORMATIONS DISPONIBLES

Dénomination du médicament vétérinaire

BULTAVO 3 SUSPENSION INJECTABLE POUR OVINS

Composition qualitative et quantitative

Chaque dose de 1 mL contient :

Substance active :

Virus inactivé Bluetongue, sérotype 3 (souche Bio-93:BTv3) ≥ 10 unités ELISA*
(* la quantité d'antigène inactivé a été déterminée par une méthode ELISA.

Adjuvants :

Hydroxyde d'aluminium 2,25 – 2,75 mg
Saponine de quillaia (Quil A) 0,2 mg

Excipients :

Composition qualitative en excipients et autres composants	Composition quantitative si cette information est essentielle à une bonne administration du médicament vétérinaire
Formaldéhyde 35%	$\leq 0,7$ mg
Thiomersal	0,085 – 0,115 mg
Chlorure de sodium	
Chlorure de potassium	
Phosphate disodique dodécahydraté	
Phosphate monopotassique	
Eau pour préparations injectables	

Forme pharmaceutique

Liquide blanc à rosé avec présence d'un sédiment.

Informations cliniques

Espèces cibles

Ovin.

Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Ovin :

Immunsation active pour réduire la virémie, prévenir les signes cliniques et la mortalité causés par le virus de la Bluetongue sérotype 3.

Début de l'immunité : 3 semaines après la fin de la primo-vaccination.

Durée de l'immunité : n'a pas été établie.

Contre-indications

Aucune.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Vacciner uniquement les animaux en bonne santé.

L'immunisation de base doit commencer à temps pour que la protection se soit pleinement développée au début de la période de risque pour l'animal (liée à l'apparition des principaux vecteurs de la maladie - les moucheron piqueurs).

Des taux élevés d'anticorps maternels affectent négativement la formation d'anticorps post-vaccinale, ce qui peut affecter le taux d'anticorps après la vaccination. Ces anticorps d'origine maternelle disparaissent généralement à l'âge de 3 mois chez les agneaux.

Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles

Sans objet.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Sans objet.

Précautions particulières concernant la protection de l'environnement

Sans objet.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Ovin :

Fréquence indéterminée :	Tuméfaction au site d'injection. Augmentation de la température.
--------------------------	---

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire à l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir la notice pour les coordonnées respectives.

Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

Gestation :

Peut être utilisé au cours de la gestation.

Lactation et fertilité :

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie durant la lactation.

L'innocuité et l'efficacité du vaccin n'ont pas été établies chez les mâles reproducteurs. Dans cette catégorie d'animaux, le vaccin devrait être utilisé en fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire et/ou les autorités nationales compétentes responsables de la politique vaccinale du moment contre le virus bluetongue (BTV).

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Aucune information n'est disponible concernant l'innocuité et l'efficacité de ce vaccin lorsqu'il est utilisé avec un autre médicament vétérinaire. Par conséquent, la décision d'utiliser ce vaccin avant ou après un autre médicament vétérinaire doit être prise au cas par cas.

Posologie et voie d'administration

Voie sous-cutanée.

Respecter les conditions habituelles d'asepsie.

Agiter doucement juste avant l'emploi. Éviter la formation de mousse car cela peut être irritant au point d'injection. Tout le contenu du flacon doit être utilisé immédiatement après ouverture et au cours de la même procédure. Éviter le multi-ponctionnement des flacons.

Avant utilisation le vaccin doit être remis à une température comprise entre 15 et 25°C.

Administrer une dose de 1 mL par voie sous-cutanée chez les ovins, selon le schéma de vaccination suivant :

Primovaccination

Chez les ovins : une injection à partir de l'âge de 1 mois chez les animaux naîfs.

Rappel

Non établi.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

L'innocuité d'un surdosage n'a pas été établie.

Restrictions d'utilisation spécifiques et conditions particulières d'emploi, y compris les restrictions liées à l'utilisation de médicaments vétérinaires antimicrobiens et antiparasitaires en vue de réduire le risque de développement de résistance

Le médicament vétérinaire a été autorisé pour une utilisation d'urgence.

L'efficacité du vaccin n'a pas été testée chez les bovins. L'innocuité du vaccin a été établie chez les bovins sur la base d'études effectuées avec un vaccin similaire contenant un autre sérotype du BTV. Par conséquent, le vaccin doit être utilisé conformément à l'évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire responsable.

Temps d'attente

Zéro jour.

Propriétés immunologiques

QI04AA02 (ovin).

Stimuler une immunité active contre le virus Bluetongue sérotype 3 chez l'animal vacciné.

Incompatibilités majeures

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments vétérinaires.

Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 12 mois.
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 10 heures.

Précautions particulières de conservation

À conserver et transporter réfrigéré (entre 2 °C et 8 °C).
Ne pas congeler.
Protéger de la lumière.

Nature et composition du conditionnement primaire

Flacons PEHD de 10 doses de 1 ml avec bouchon en élastomère chlorobutyle.
Flacons PEHD de 50 doses de 1 ml avec bouchon en élastomère chlorobutyle.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

Nom et adresse de l'importateur / Titulaire de l'ATU

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
29 AVENUE TONY GARNIER
69007 LYON
FRANCE

Présentation(s) disponible(s)

Boîte de 1 flacon de 10 doses (1 x 10 mL)
Boîte de 1 flacon de 50 doses (1 x 50 mL)

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Mentions réglementaires

USAGE VETERINAIRE.
AUTORISATION TEMPORAIRE D'UTILISATION N° 90066.