

Recommandations vaccinales en cliquant [ici](#)

Vaccins FCO contre les sérotypes 3, 4 et 8 utilisables en France					SPECIFICATIONS RCP DES VACCINS				Usage
Laboratoire fabricant	Dénomination du vaccin	Laboratoire distributeur en France	Accès du vaccin	Espèce(s) visée(s)	Primo-vaccination Sous-cutanée (SC) Intramusculaire (IM)	Age mini	Délai installation immunité complète après primovaccination	Durée d'immunité	
Boehringer-Ingelheim	BTV Pur 4 et 8	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaire et PSE	Bovin Ovin Autre ¹	2 inj à 3-4 sem (1ml SC)	2,5 mois	3 sem	12 mois	Protection sanitaire Mouvement
SYVA ²	Syvazul 4 et 8²	Inovet	Vétérinaire et PSE	Ovin à privilégier ₂	OV: 1 seule injection (2ml SC)	3 mois	39 jours	12 mois	Protection sanitaire Mouvement
CZV	Bluevac 8	Melchior	Vétérinaire et PSE	Bovin Ovin Autre ¹	2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)	2 mois 2,5 mois	31 jours 21 jours	12 mois	Protection sanitaire Mouvement
Boehringer-Ingelheim	Bultavo 3	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaire uniquement (ATU)	Bovin Ovin	2 inj à 3 sem (2ml IM) 1 seule injection (1 ml SC)	2,5 mois 3 mois	3 sem	Non déterminé	Protection sanitaire <i>Mouvement³: Bovin uniquement⁴</i>
CZV	Bluevac 3	Melchior	Vétérinaire uniquement (ATU)	Bovin ³ Ovin ³	2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Protection sanitaire ⁵
Vaccins contre la MHE utilisable en France					SPECIFICATIONS RCP DES VACCINS				Usage
CEVA	Hepizovac	CEVA	Vétérinaire uniquement (ATU)	Bovin	2 inj à 3 sem (4ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Protection sanitaire Mouvement ³

1-Utilisable pour d'autres espèces dans le cadre de la cascade

2-A réserver pour les ovins car une seule injection

3-L'utilisation possible du vaccin dans le cadre des mouvements dépend du pays destinataire

4-Certains pays acceptent des mouvements avec ce vaccin pour les ovins pour certaines de leurs zones

5-Certains pays acceptent des mouvements avec ce vaccin pour les ovins et les bovins pour certaines de leurs zones