

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA LEPTOSPIROSE PAR LES RONGEURS DE COMPAGNIE



La **leptospirose** est une maladie transmise via l'urine ou l'environnement souillé par l'urine de différents animaux, sauvages ou domestiques, en particulier les rongeurs. Lorsqu'ils sont porteurs de la bactérie, ces derniers ne présentent pas de symptôme mais l'excètent durant toute leur vie.

Chez l'Homme, la leptospirose se manifeste le plus souvent par un syndrome grippal, mais elle peut s'aggraver, voire causer le décès.

En cas de symptômes (fièvre > 38,5 °C, douleurs musculaires / articulaires, maux de tête) : **consultez rapidement votre médecin**, en lui signalant le contact avec un rongeur. Le traitement est d'autant plus efficace qu'il est donné tôt.

**Propriétaires
de rongeurs de compagnie,
évitez d'être contaminés
grâce à
des gestes simples :**



Porter des gants, un masque et des lunettes de protection en changeant la litière



Se laver les mains après chaque manipulation de l'animal



Ne pas manipuler l'animal en cas de blessure sur les mains (ou protéger les plaies avec des pansements étanches ou porter des gants)



Eviter les contacts avec l'animal lorsque vous êtes en train de manger ou boire



Eviter les contacts de l'animal avec votre visage.



Pour les rongeurs, ni le traitement antibiotique, ni le vaccin n'ont fait la preuve d'une efficacité.

Pour en savoir plus : rendez-vous sur les sites de l'ARS BFC et du Ministère de l'Agriculture :

