

SYNTHESE DES BILANS DEPARTEMENTAUX DE MORTALITE DES BOVINS



Campagne avril 2025- mars 2026



gtv Bourgogne
Franche-Comté
GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Qu'est ce qu'OMAR ?

Omar, l'Observatoire de la mortalité des animaux de rente, est un **dispositif de surveillance** qui vise à détecter des dégradations de l'état de santé du cheptel. Il produit des **outils à destination des professionnels, éleveurs et vétérinaires, et de l'Administration**, permettant de mener des **actions individuelles et collectives** vis-à-vis de la **mortalité et du bien-être animal** : surveillance, prévention, contrôle. Dans un premier temps, le développement d'Omar concerne le **cheptel bovin**.



Santé & bien-être animal




Outils : Bilan départemental

Mise à jour trimestrielle – pas de temps annuel (avril 2025 à mars 2026)


Données BDNI

- Document PDF 35 pages complet et complexe
- Situation de la mortalité dans le département
 - Globale
 - Par catégorie d'élevage
 - Référentiels départementaux et nationaux

Classement mortalité avril 2025 – mars 2026



Répartitions départementales par catégories d'élevages



Carte. Répartition (%) des élevages dans les différentes catégories dans chaque département en France pour la période avril 2025-mars 2026.

La proportion des élevages engraisseurs stricts est assez homogène entre les départements (entre 0 et 10% du total des élevages présents dans chaque département).


Les départements avec la plus forte proportion d'élevages allaitants naisseurs-engraisseurs sont concentrés au centre de la France (Nièvre, Cher, Allier, Indre et Creuse).

On peut visualiser deux zones très laitières (plus de 50% d'élevages laitier naisseurs) : Bretagne, Nord et Est montagneux.




Bilan départemental : Côte d'Or (21)

- 1 280 cheptels (dont 18% n'ont déclaré aucune mortalité)
- 12 144 bovins morts (soit 4% de mortalité globale) – 51^{ème} position
 - <21 jours : 45%
 - * Dont <8 jours : 5,9%
 - 21jours-12mois : 27%
 - 12mois-24 mois : 5%
 - +2 ans : 23%
- Indice Comparatif de Mortalité (SMR) par type d'élevage et classement national



Catégorie	SMR	Rang national	Signal
Mixtes nais.-eng.	74	39/96	✓ Très favorable
Laitiers nais.-eng.	82	38/96	✓ Favorable
Mixtes naisseurs	92	45/96	✓ Favorable
Très petits élevages	92	48/96	✓ Dans la norme (à relativiser)
Laitiers naisseurs	95	47/96	✓ Légèrement favorable
Allaitants nais.-eng.	104	44/96	➡ Dans la moyenne
Autre prod. bovine	105	68/96	⚠ Légèrement défavorable
Allaitants naisseurs	109	66/96	⚠ Défavorable — signal à surveiller
Engraisseurs stricts	87	37/96	✓ Favorable




Bilan départemental : Doubs (25)

2 055 cheptels (dont 12 % n'ont déclaré aucune mortalité)


18 602 bovins morts (soit 5%) – 9^{ème} position

- <21 jours : 60%
 - * Dont <8 jours : 6,8%
- 21 jours-12 mois : 17%
- 12 mois-24 mois : 3%
- +2 ans : 19%

Proportion des bovins morts - Doubs



Répartitions des élevages - Doubs



Indice Comparatif de Mortalité (SMR) par type d'élevage

CATÉGORIE D'ÉLEVAGE	NB ÉLEVAGES	SMR	RANG NATIONAL	APPRÉCIATION	TENDANCE (16 TRIM.)
Laitiers naisseurs 76 % des élevages du dépt.	1 554	72	16 ^e / ~96 dépts.	Mortalité basse ✓	Inférieur au national — tendance favorable stable
Laitiers naisseurs-engraisseurs	115	83	39 ^e	Mortalité basse ✓	Inférieur au national — stable
Allaitants naisseurs	38	85	18 ^e	Mortalité basse ✓	Majoritairement supérieur au national Δ
Allaitants naisseurs-engraisseurs	44	93	20 ^e	Mortalité basse ✓	Inférieur au national — favorable
Mixtes naisseurs	21	97	57 ^e	Dans la moyenne nationale	Supérieur au national (attention : effectif faible)
Mixtes naisseurs-engraisseurs	14	102	71 ^e	Dans la moyenne nationale	Inférieur au national mais SMR légèrement au-dessus de 100
Engraisseurs stricts	63	65	18 ^e	Mortalité basse ✓	Inférieur au national — très favorable
Très petits élevages	158	25	5 ^e	Mortalité très basse ✓✓	Inférieur au national — excellent
Autre production bovine	48	110	72 ^e	Mortalité supérieure Δ	Inférieur au national mais SMR seul > 100 — à surveiller
Toutes catégories confondues	2 055	74	9 ^e (très favorable)	Mortalité globale basse ✓	Position très favorable en France métropolitaine

SMR = ratio observé/attendu × 100 - Référence : 100 = niveau national - Source : OMAR / BDNI, données au 21 avril 2026




Bilan départemental : Jura (39)

1 272 cheptels (dont 18 % n'ont déclaré aucune mortalité)


13 058 bovins morts (soit 6%) – 31^{ème} position

- < 21 jours : 56%
 - ★ Dont <8 jours : 8,8%
- 21 jours-12 mois : 20%
- 12 mois-24 mois : 3%
- +2 ans : 18%

Proportion des bovins morts - Jura



Répartitions des élevages - Jura



Indice Comparatif de Mortalité (SMR) par type d'élevage

CATÉGORIE D'ÉLEVAGE	NB ÉLEVAGES	SMR	RANG NATIONAL	APPRÉCIATION	TENDANCE (16 TRIM.)
Laitiers naisseurs 54 % des élevages du dépt.	682	90	35 ^e / ~96 dépts.	Mortalité basse ✓	Inférieur au national — mais % mort < 8j élevé (9,4%) Δ
Laitiers naisseurs-engraisseurs	103	107	78 ^e	Surveillance requise Δ	Inférieur au national mais SMR : 100 — tendance dégradée
Allaitants naisseurs	52	99	43 ^e	Dans la moyenne nationale	Inférieur au national — stable
Allaitants naisseurs-engraisseurs	77	103	42 ^e	Légèrement au-dessus Δ	Inférieur au national mais SMR au-dessus de 100
Mixtes naisseurs	21	97	57 ^e	Dans la moyenne nationale	Inférieur au national — effectif faible
Mixtes naisseurs-engraisseurs	11	93	60 ^e	Dans la moyenne nationale	Supérieur au national sur 16 trim — mais SMR < 100 (effectif très faible)
Engraisseurs stricts	74	128	84 ^e	Mortalité élevée ΔΔ	Équivalent au national — mais SMR très au-dessus, à investiguer
Très petits élevages	181	90	44 ^e	Dans la moyenne nationale	Inférieur au national — acceptable
Autre production bovine	71	134	86 ^e	Mortalité élevée ΔΔ	Inférieur au national mais SMR fortement > 100 — priorité
Toutes catégories confondues	1 272	94	31 ^e (position médiane)	Dans la moyenne nationale	Position intermédiaire — hétérogénéité entre catégories notable

SMR = ratio observé/attendu × 100 · Référence : 100 = niveau national · Source : OMAR / BDNI, données au 21 avril 2026




Bilan départemental : Nièvre (58)

1 646 cheptels (dont 15 % n'ont déclaré aucune mortalité)


17 802 bovins morts (soit 4 %) – 71^{ème} position

- < 21 jours : 41%
 - ★ Dont <8 jours : 4,9%
- 21 jours-12 mois : 30%
- 12 mois-24 mois : 5%
- +2 ans : 21%

Proportion des bovins morts - Nièvre



Répartitions des élevages - Nièvre



Indice Comparatif de Mortalité (SMR) par type d'élevage

CATÉGORIE D'ÉLEVAGE	SMR	RANG	APPRÉCIATION	TENDANCE / SIGNAL
Allaitants naisseurs 281 élevages — 17% du dépt	104	57 / 96	⚠ Vigilance	Taux le plus souvent supérieur au national sur 4 ans. Surmortalité 8-20j (x1,2) et 6-12m (x1,27).
Allaitants naisseurs-engraisseurs 978 élevages — 59% du dépt * dominante	103	42 / 96	✓ Satisfaisant	Proche de la moyenne ; poids volume majeur. Surmortalité post-néonatale 8-20j (x1,18) et 6-12m (x1,24).
Laitiers naisseurs 25 élevages — 2% du dépt	121	92 / 96	✗ Préoccupant	Dans les 5% les plus touchés. Ratios 21j-6m et 6-12m à 200. Signal fort malgré le faible effectif.
Laitiers naisseurs-engraisseurs 4 élevages — <1% du dépt	140	90 / 96	✗ Préoccupant	SMR le plus élevé du dépt. Résultats statistiquement fragiles (n=4). Ratios 6-12m et 12-24m à 200.
Mixtes naisseurs 11 élevages — 1% du dépt	104	65 / 96	⚠ Vigilance	Surmortalité sur 21j-6m (x1,48) et 6-12m (x1,63). Effectif limité, interprétation prudente.
Mixtes naisseurs-engraisseurs 6 élevages — <1% du dépt	75	40 / 96	★ Favorable	Meilleur SMR du dépt. Effectif très faible (n=6) : résultat peu robuste, à ne pas surinvestir.
Engraisseurs stricts 80 élevages — 5% du dépt	115	75 / 96	⚠ Vigilance	Taux brut équivalent au national, mais SMR élevé. Mortalité concentrée : quand elle survient, elle est intense (6-12m x1,52 ; 12-24m x1,66).
Très petits élevages 188 élevages — 79% sans mortalité déclarée	128	79 / 96	⚠ Vigilance	SMR élevé mais taux brut inférieur au national. Discordance structurelle — pertinence épidémiologique limitée.
Autre production bovine 73 élevages — 53% sans mortalité déclarée	81	32 / 96	★ Favorable	Bonne performance, sous la moyenne nationale sur les 4 ans. Majorité d'élevages sans mortalité.




Bilan départemental : Haute-Saône (70)

1 226 cheptels (dont 19 % n'ont déclaré aucune mortalité)


12 985 bovins morts (soit 5 %) – 26^{ème} position

- <20 jours : 40%
 - * Dont <8 jours : 5,9%
- 21jours-12mois : 23%
- 12mois-24 mois : 6%
- +2 ans : 29%

Proportion des bovins morts - Haute-Saône



Répartitions des élevages - Haute-Saône



Indice Comparatif de Mortalité (SMR) par type d'élevage

CATÉGORIE D'ÉLEVAGE	SMR	RANG	APPRÉCIATION	TENDANCE / SIGNAL
Allaitants naisseurs 135 élevages — 11% du dépt	90	23 / 96	★ Favorable	Taux le plus souvent inférieur au national sur 4 ans. Ratios bien maîtrisés sur toutes les classes d'âge (<8j: ratio 69).
Allaitants naisseurs-engraisseurs 203 élevages — 17% du dépt	121	80 / 96	✗ Préoccupant	Taux brut équivalent au national mais SMR élevé. Surmortalité marquée post-néonatale : 21j-6m (x1,27), 6-12m (x1,32), 12-24m (x1,6), >2ans (x1,53).
Laitiers naisseurs 392 élevages — 32% du dépt * dominante	87	32 / 96	★ Favorable	Taux le plus souvent inférieur au national sur 4 ans. Bonne maîtrise sur toutes les classes d'âge. Catégorie majoritaire bien performante.
Laitiers naisseurs-engraisseurs 82 élevages — 7% du dépt	77	32 / 96	★ Favorable	Meilleur SMR du département. Taux le plus souvent inférieur au national sur 4 ans. Ratios très bons sur toutes les classes d'âge.
Mixtes naisseurs 38 élevages — 3% du dépt	86	33 / 96	★ Favorable	Taux le plus souvent inférieur au national. Léger signal 6-12m (ratio 129) à surveiller, reste globalement bien placé.
Mixtes naisseurs-engraisseurs 41 élevages — 3% du dépt	92	56 / 96	✓ Satisfaisant	Taux le plus souvent inférieur au national. Situation globalement maîtrisée, ratios proches de 100 sur la plupart des classes d'âge.
Engraisseurs stricts 87 élevages — 7% du dépt	115	75 / 96	⚠ Vigilance	Taux brut équivalent au national. Mortalité concentrée, intense quand elle survient : >2ans (ratio 149), 6-12m (ratio 125). Même profil que la Nièvre.
Très petits élevages 196 élevages — 79% sans mortalité déclarée	160	86 / 96	✗ Préoccupant	SMR très élevé mais taux brut inférieur au national — discordance structurelle typique. Ratios 8-20j (200) et 12-24m (198) signalent une mortalité concentrée sur peu d'élevages.
Autre production bovine 52 élevages — 40% sans mortalité déclarée	105	68 / 96	⚠ Vigilance	Taux brut équivalent au national sur 4 ans. Ratios >100 sur plusieurs classes d'âge : <8j (125), 8-20j (117), 21j-6m (121), 6-12m (118).



Bilan départemental : Saône-et-Loire (71)

3 266 cheptels (dont 20 % n'ont déclaré aucune mortalité)

29 826 bovins morts (soit 4 %) – 33^{ème} position

→ < 21 jours : 42%


★ Dont <8 jours : 4,9%

→ 21jours-12mois : 29%

→ 12mois-24 mois : 6%

→ +2 ans : 23%


Proportion des bovins morts - Saône-et-Loire



Indice Comparatif de Mortalité (SMR) par type d'élevage

Catégorie d'élevage	SMR	Rang	Appréciation	Tendance / signal
Allaitant naisseur	105	60 / 96	Défavorable	Surmortalité globale vs national. Signal fort sur 12-24 mois (ratio 155) et 21j-6m (119). Veaux <8j en hausse : 4,9 %.
Allaitant naisseur-engraisseur	92	19 / 96	Favorable	Catégorie dominante (54 %). Mortalité globale sous la moyenne nationale de façon constante sur 16 trimestres.
Laitier naisseur	98	58 / 96	Neutre	Dans la moyenne nationale. Vigilance sur veaux <8j en hausse : 8,4 %. Ratio 21j-6m : 114.
Laitier naisseur-engraisseur	81	36 / 96	Favorable	SMR le plus bas du département. Effectif réduit (29 élevages) — interprétation prudente.
Mixte naisseur	96	55 / 96	Neutre	Légèrement sous la médiane nationale. Signal sur 21j-6m (ratio 110) et 6-12m (112). Faible effectif.
Mixte naisseur-engraisseur	86	46 / 96	Favorable	Bonne performance globale. Anomalie sur 12-24m (ratio 185) à surveiller malgré l'effectif très faible.
Engraisseur strict	103	58 / 96	Défavorable	Signal sur 21j-6m (ratio 119) et 12-24m (124). 42 % des élevages sans mortalité déclarée — concentration du risque.
Très petits élevages	106	65 / 96	Défavorable	SMR le plus élevé du département. 82 % sans mortalité déclarée → surmortalité concentrée. Ratios <8j (116) et 8-20j (140) préoccupants.
Autre production bovine	91	53 / 96	Favorable	Sous la médiane nationale. Catégorie hétérogène. Pic sur 8-20j (ratio 146) à nuancer.

Répartitions des élevages - Saône-et-Loire




Bilan départemental : Yonne (89)

- 690 cheptels (dont 22 % n'ont déclaré aucune mortalité)


- 5 963 bovins morts (soit 4 %) – 56^{ième} position

- <21 jours : 40%
 - * Dont <8 jours : 5,7%
- 21jours-12mois : 31%
- 12mois-24 mois : 5%
- +2 ans : 27%



- Indice Comparatif de Mortalité (SMR) par type d'élevage et classement national

Catégorie	SMR	Rang national	Signal
Mixtes naisseurs	75	26/96	✓ Très favorable
Laitiers naisseurs	93	43/96	✓ Favorable
Allaitants naisseurs	100	45/96	➔ Dans la moyenne
Allaitants nais.-eng.	102	39/96	➔ Dans la moyenne
Laitiers nais.-eng.	103	71/96	⚠ Légèrement défavorable
Mixtes nais.-eng.	112	83/96	⚠ Défavorable
Engraisseurs stricts	136	86/96	● Préoccupant
Très petits élevages	200	95/96	● Très préoccupant (à relativiser, voir ci-dessous)



SMR > 200 : À interpréter avec précaution : 105 élevages sur 126 n'ont déclaré aucune mortalité



Bilan départemental : Territoire de Belfort (90)

150 cheptels (dont 31 % n'ont déclaré aucune mortalité)

Indice Comparatif de Mortalité (SMR) par type d'élevage

1 101 bovins morts (soit 4 %) – 13^{ème} position

→ < 21 jours : 48%


★ Dont <8 jours : 5,9%

→ 21jours-12mois : 18%


→ 12mois-24 mois : 4%

→ +2 ans : 29%

Proportion des bovins morts - Territoire de Belfort



Répartitions des élevages - Territoire de Belfort



SMR par catégorie d'élevage – Territoire de Belfort (90) Avril 2025 – mars 2026 · n=150 élevages

CATÉGORIE	SMR	RANG	APPRÉCIATION	INTERPRÉTATION / TENDANCE
Toutes catégories	79	13e / 96	Favorable	Mortalité globale nettement sous la référence nationale. Position parmi les meilleurs départements.
Allaitants naisseurs	86	21e / 96	Bon	Mortalité sous la référence, tendance favorable et stable sur 16 trimestres.
Allaitants naisseurs-engraisseurs	102	40e / 96	Moyen	Mortalité dans la moyenne nationale. Vigilance sur les <8 j (ratio 139) et 6-12 m (ratio 126).
Laitiers naisseurs	80	24e / 96	Favorable	Mortalité globalement favorable. Légère surmortalité 6-12 mois (ratio 105) à surveiller.
Laitiers naisseurs-engraisseurs	46	13e / 96	Très favorable	Mortalité très basse, tous ratios bien inférieurs à 100. Résultats parmi les meilleurs nationaux.
Mixtes naisseurs	75	27e / 96	Bon	Mortalité inférieure à la référence, hormis un ratio 6-12 m légèrement au-dessus (106).
Mixtes naisseurs-engraisseurs	156	96e / 96	Alerte	Surmortalité majeure, dernier rang national. Excès marqué sur toutes les classes adultes (>21j). N=2 élevages : volatilité élevée mais signal à investiguer.
Engraisseurs stricts	80	28e / 96	Bon	Mortalité favorable globalement. Ratio <8 j à 200 : artefact probable (très faibles effectifs).
Très petits élevages	36	6e / 96	Très favorable	Très faible mortalité, 39/43 élevages sans décès. Parmi les 5 meilleurs départements.
Autre production bovine	41	8e / 96	Très favorable	Mortalité très faible (2/3 élevages sans décès). Effectifs trop réduits pour tirer des conclusions solides.

● Favorable / Très favorable : SMR < 80 ● Bon : SMR 80-99 ● Moyen : SMR 100-109 ● Alerte : SMR ≥ 110



Conclusions et préconisations

- **Les catégories d'âge qui comptabilisent une mortalité plus importante sont les veaux et les jeunes bovins**
 - Causes probables : pathologies +/- défaillance immunitaire
 - Préconisations :
 - * sensibilisation des éleveurs à la bonne prise du colostrum, veiller à sa qualité (alimentation, eau, complémentation oligo-vitamines, vaccination)
 - * Rappel des mesures de biosécurité et des 5 libertés en bien-être animal
 - * Rappel sur l'impact du bâtiment (prévenir les pathologies respiratoires), du parasitisme, des transitions alimentaires (prévenir les entérotoxémies)

