

[Recommandations vaccinales-cliquer ici](#)

[Conditions aux échanges intra-communautaires – cliquer ici](#)

[Ressources documentaires–GDS France : Cliquer ici](#)

[Ressources documentaires-Sngtv : cliquer ici](#)

Vaccins utilisables en France						SPECIFICATIONS RCP DES VACCINS				
Maladie	Laboratoire fabricant	Nom du vaccin	Laboratoire distributeur en France	Accès au vaccin	Espèce(s) visée(s) Autre ¹	Primo-vaccination Sous-cutanée (SC) Intramusculaire (IM)	Age mini ²	Délai installation immunité après primovaccination	Durée d'immunité	Indication ³
FCO	Boehringer-Ingelheim	BTV Pur 4 et 8	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaire et PSE ⁴	Bovin Ovin	2 inj à 3-4 sem (1ml SC)	2,5 mois	3 sem	12 mois	Prévention la virémie
		BTV Pur 8				1 seule inj (1ml SC)				
	SYVA	Syvazul 1 et 8	Inovet		Bovin Ovin	2 inj à 3 sem (4ml IM)	3 mois	39 jours		Prévention de la virémie pour les sérotypes 1 et 8
		Syvazul 4 et 8				1 seule inj (2ml SC)		21 jours		
	CZV	Bluevac 4-8	Melchior		Bovin Ovin	2 inj à 3-4 sem (4ml SC)	2 mois 2,5 mois	31 jours		Prévention la virémie
		Bluevac 8				2 inj à 3 sem (2ml SC)		21 jours		
		Bluevac 1				2 inj à 3-4 sem (4ml SC)		2 mois	28 jours	
	Boehringer-Ingelheim	Bultavo 3	Boehringer-Ingelheim		Bovin Ovin	2 inj à 3 sem (4ml SC)	2,5 mois 3 mois	28 jours	Non déterminé	Prévention de la virémie chez les bovins Réduction chez les ovins
						1 seule inj (2ml SC)		21 jours		
	Boehringer-Ingelheim	Bultavo 3	Boehringer-Ingelheim		Bovin Ovin	2 inj à 3 sem (1ml IM)	2,5 mois 3 mois	3 sem	Non déterminé	Prévention de la virémie chez les bovins Réduction chez les ovins
						1 seule inj (1 ml SC)		3 sem		
	CZV	Bluevac 3	Melchior		Bovin Ovin	2 inj à 3-4 sem (4ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Réduction de la virémie
2 inj à 3 sem (2ml SC)				3 sem						
SYVA	Syvazul 3	Inovet	Bovin Ovin	2 inj à 3 sem (2ml IM)	3 mois	3 sem	Non déterminé	Réduction de la virémie		
				1 seule inj (2 ml SC)		4 sem				
MHE	CEVA	Hepizovac	CEVA	Vétérinaire uniquement ⁵	Bovin	2 inj à 3 sem (4ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Prévention de la virémie

1- Utilisable pour d'autres espèces dans le cadre de la cascade (protocole à adapter par le vétérinaire)

2- Au vu de la circulation large des sérotypes 3 et 8, ne sont reportés ici que les délais concernant les animaux issus de mères immunisés

3- Prévention ou réduction de la virémie. La prévention apporte une protection plus forte

4- À voir avec le détenteur du PSE s'il les référence

5- Seul le vaccin sous sa forme ATU est actuellement disponible, bien que ce vaccin ait reçu son AMM